



Behandling med allopurinol

Hvad er allopurinol?

Allopurinol er det virksomme stof i præparatet af samme navn.

Hvilke sygdomme behandles med allopurinol?

Allopurinol er grundstenen i behandling af urinsyreigt, også kaldet podagra eller arthritis urica. Det stopper ikke akutte anfald, men forebygger nye anfald.

Hvordan virker allopurinol?

Allopurinol nedsætter produktionen af urinsyre i kroppen, så indholdet af urinsyre i dit blod bliver mindre. Hyppigheden af anfald af urinsyreigt vil derfor efterhånden falde og til sidst vil de helt ophøre.

Hvor længe gives behandlingen?

Behandlingen er som udgangspunkt livslang, da allopurinol ikke fjerner årsagen til din forhøjede urinsyre i blodet, men alene behandler niveauet ned.

Hvordan tages behandlingen?

Behandlingen er tabletbehandling, der tages dagligt. Tabletterne findes som 100 mg eller 300 mg.

Typisk startes behandlingen med 100 mg dagligt og trappes så langsomt op indtil behandlingsmålet for din urinsyre i blodet er nået.

Du må gerne dele eller knuse tabletterne.

Det er vigtigt, at du drikker rigeligt væske hver dag (mindst 2 liter vand, saft eller lignende).

Hvordan opbevares allopurinol?

Allopurinol opbevares bedst i den originale emballage beskyttet mod fugt. Opbevares ved stuetemperatur.

Hvis jeg har glemt at tage allopurinol

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du ikke tage to på én gang. Tag i stedet din næste tablet på det tidspunkt du plejer, og fortsæt som før.

Bivirkninger

De fleste tåler behandlingen med allopurinol uden problemer. Dog kan der forekomme bivirkninger. Den hyppigste bivirkning er opblussen af din urinsyreigt. Denne forværring skyldes at urinsyren i blodet ændrer sig (falder), når du tager allopurinol, og dette kan fremprovokere anfald. Denne forværring er midlertidig og kan lindres eller modvirkes ved samtidig ordination af betændelsesdæmpende medicin (oftest colchicin). Henvend dig til din læge, hvis du oplever forværring af gigten, og ikke har noget anfaldsmedicin, der lindrer forværringen.

Af andre bivirkninger kan nævnes:

- Kvalme
- Diarré
- Hudkløe og udslæt

Sjældent:

- Påvirkning af knoglemarven
- Leverpåvirkning
- Alvorlig allergisk hududslæt

Risikoen for de sjældne, men alvorligere bivirkninger vil der blive holdt øje med i blodprøverne. Samlet overblik over bivirkninger kan ses i indlægssedlen. Hvis du oplever bivirkninger kontakt da dit behandlingssted.



Forholdsregler når du er i behandling med allopurinol

Rejser

Vi anbefaler, at du kontakter dit forsikringsselskab forud for udlandsrejser, når du er i behandling med allopurinol.

Øvrigt

Der forventes ikke pauser i behandlingen. Særligt bør du IKKE holde pause i behandlingen med allopurinol, hvis du får et anfald med ledsmerter. Du bør også fortsætte behandlingen ved anden sygdom (som fx feber).

Allopurinol og anden medicin

- Azatioprin/mercaptopyrin – samtidig behandling øger kraftigt koncentrationen af azatioprin/mercaptopyrin, tal med din læge om dette
- Cytostatika/kræftbehandling – nogle typer medicin, der bruges i behandlingen af kræft, kræver at du kontrolleres hyppigere med blodprøver, når du samtidig får allopurinol

Graviditet og amning

Bør ikke benyttes af gravide eller ammende.

Hvis du ønsker at blive gravid, anbefaler vi at du planlægger graviditeten i samråd med din reumatolog.

Blodprøvekontrol

I starten vil du blive indkaldt til regelmæssige blodprøvekontroller for at sikre, at din urinsyre i blodet falder til et passende niveau og at du kan tåle medicinen.

Blodprøveresultaterne bliver set, og du bliver efterfølgende kontaktet, hvis der er behov for det.

Yderligere spørgsmål?

Er du i tvivl eller har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte dit behandlingssted.

Derudover henviser vi til indlægssedlen i pakken med medicin.